

Digoxine (Lanoxin ou Toloxin)

Pourquoi mon médecin m'a prescrit ce type de médicaments?

La digoxine accroît la force de contraction du cœur et ralentit la fréquence cardiaque. Cette dernière propriété permet d'éviter que les battements du cœur soient trop rapides et par conséquent de minimiser vos symptômes (palpitations, inconfort à la poitrine, etc.) lors de la présence de fibrillation auriculaire. Plus fréquemment utilisée par le passé, la digoxine s'emploie plus rarement de nos jours dans le traitement de la fibrillation auriculaire. Néanmoins, la digoxine demeure un choix intéressant pour certains patients sélectionnés, notamment pour ceux qui souffrent également d'insuffisance cardiaque.

Comment devrais-je prendre ce médicament?



Déjeuner


Dîner

Souper

Coucher

Ce médicament est généralement donné 1 fois par jour avec ou sans nourriture. Il est possible que votre médecin vous ait indiqué de le prendre autrement.

Voici quoi faire en cas d'oubli :



Quels sont les principaux effets secondaires qu'il est possible que je ressente?

Effets secondaires	Actions suggérées	Quand consulter?
↓ Fréquence cardiaque	Vous pouvez vérifier vos pulsations environ 1 à 2 fois par semaine en début de traitement, puis si vous ressentez des symptômes	Dès que possible, via l'urgence au besoin, si < 40 battements par minute et/ou symptômes d'étourdissement/fatigue/faiblesse/perte de conscience
Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales	-	Dès que possible, via l'urgence si besoin, car pourrait être un signe de toxicité à la digoxine
Changements dans la vision - Vision trouble, halo jaune (rare)	-	

Tous les médicaments peuvent causer des réactions indésirables et la plupart d'entre elles sont temporaires ou ne sont pas dangereuses. À l'initiation d'un nouveau traitement, vous devez être attentif aux symptômes que vous ressentez.

Si vous ne tolérez pas ce médicament,
parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien sur la conduite à tenir.

Quels sont les suivis généralement effectués?

	Suivi	Fréquence
	Électrocardiogramme	1 à 2 fois par année
	Prise de sang	1 à 2 fois par année, ou selon le besoin de vérifier le taux de digoxine dans le sang