

Sotalol (Sotacor)

Pourquoi mon médecin m'a prescrit ce médicament?

Le sotalol fait partie de la famille des antiarythmiques. Ce médicament agit en modifiant la conduction électrique de votre cœur et régularise votre rythme cardiaque. Cette propriété s'avère utile lorsque le cœur présente un rythme anormal, parfois rapide, comme c'est le cas avec la fibrillation auriculaire. Il est généralement prescrit lorsque les symptômes (par exemple : palpitations) nuisent à votre qualité de vie.

Comment devrais-je prendre ce médicament?



Déjeuner

Diner




Souper

Coucher

Ce médicament est généralement donné 2 fois par jour avec ou sans nourriture.

Ne prenez pas d'antiacide contenant de l'aluminium ou du magnésium dans les 2 heures précédant ou suivant la prise de ce médicament puisque cela nuit à son absorption par le tube digestif.

Voici quoi faire en cas d'oubli :



Quels sont les principaux effets secondaires qu'il est possible que je ressente?

Effets secondaires	Actions suggérées	Quand consulter?
Étourdissements	Levez-vous lentement Évitez les activités nécessitant votre attention (conduite automobile, opération de machinerie, etc.)	Si cela provoque une chute, une perte de conscience ou persiste > 2-4 semaines
↓ Fréquence cardiaque	Vous pouvez vérifier vos pulsations environ 1 à 2 fois par semaine en début de traitement, puis si vous ressentez des symptômes	Dès que possible, via l'urgence au besoin, si < 40 battements par minute et/ou symptômes d'étourdissement/fatigue/faiblesse/perte de conscience
Fatigue **Cet effet secondaire est généralement temporaire et davantage présent en début de traitement**		Si cela empêche la réalisation de vos activités quotidiennes pour une période > 2 semaines



Effets secondaires	Actions suggérées	Quand consulter?
Baisse de résistance à l'activité physique	Suite à l'initiation du traitement, recommencez l'activité physique de façon graduelle ou selon les recommandations de votre médecin	Si cela nuit à votre qualité de vie
Chez les diabétiques, certains symptômes d'hypoglycémie (surtout palpitations et tremblements) peuvent être masqués	Soyez attentif aux autres symptômes d'hypoglycémie (fringale subite, transpiration, pâleur, etc.) Mesurez votre glycémie en cas de doute	Si vous faites des hypoglycémies à plusieurs reprises avec votre traitement pour le diabète.
↓ libido et trouble de l'érection	-	Si cela nuit à votre qualité de vie

Tous les médicaments peuvent causer des réactions indésirables et la plupart d'entre elles sont temporaires ou ne sont pas dangereuses. À l'initiation d'un nouveau traitement, vous devez être attentif aux symptômes que vous ressentez. **Vous devez consulter si vous ressentez de l'essoufflement, des douleurs thoraciques, des pertes de conscience ou une aggravation de vos palpitations.**

N'arrêtez pas ce médicament subitement.

Si vous ne tolérez pas ce médicament, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien sur la conduite à tenir.

Quels sont les suivis généralement effectués?

	Suivi	Fréquence
	Électrocardiogramme	1 à 2 fois par année
	Prise de sang	1 à 2 fois par année