

Warfarine (Coumadin)

Pourquoi mon médecin m'a prescrit ce médicament?

La warfarine fait partie de la famille des anticoagulants. Ce médicament agit en éclaircissant le sang, ce qui diminue les risques de formation de caillots. La fibrillation auriculaire peut provoquer la formation de caillots à l'intérieur du cœur. Ceux-ci peuvent voyager dans le corps et ainsi causer une embolie en bloquant une artère d'un membre ou d'un organe, ou se rendre au cerveau et causer un accident vasculaire cérébral (AVC).

Voici les critères sur lesquels votre médecin s'est basé pour évaluer la nécessité de vous anticoaguler, et ainsi diminuer votre risque d'embolie et d'AVC :

- Âge > 65 ans
- Hypertension artérielle
- ↓ force musculaire du cœur
- Diabète
- Antécédent d'AVC ou d'embolie

Comment devrais-je prendre ce médicament?



Déjeuner

Dîner


Souper

Coucher

Ce médicament est donné 1 fois par jour avec ou sans nourriture. Prenez-le au même moment à chaque jour, par exemple toujours avec votre souper.

L'efficacité de la warfarine est influencée par plusieurs facteurs, dont l'alimentation et les médicaments. Avant de prendre des médicaments en vente libre et les produits de santé naturels parlez-en avec votre médecin ou avec votre pharmacien.

Voici quoi faire en cas d'oubli :



Quels sont les principaux effets secondaires qu'il est possible que je ressente?

Effets secondaires	Quand consulter?
Saignements de nez ou des gencives	Dès que possible, via l'urgence au besoin, si persistants plus que quelques heures ou abondants,
Sang rouge dans les selles, selles noires, vomissements de sang ou brunâtres (allure grains de café), pertes de sang par le vagin entre les menstruations ou si ménopausée	Immédiatement via l'urgence
Maux de tête soudains, paralysie, trouble de vision ou incapacité de parler	Immédiatement via l'urgence

Tous les médicaments peuvent causer des réactions indésirables et la plupart d'entre elles sont temporaires ou ne sont pas dangereuses. À l'initiation d'un nouveau traitement, vous devez être attentif aux symptômes que vous ressentez.

Si vous ne tolérez pas ce médicament,
parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien pour la conduite à tenir.

Si vous faites une mauvaise chute ou si vous vous frappez la tête, il est conseillé d'aller consulter pour s'assurer qu'il n'y ait pas de saignements importants qui pourraient initialement passer inaperçus.

Quel est le suivi généralement effectué?

	Suivi	Fréquence
	Analyse de sang pour mesurer l'efficacité de la warfarine (appelée «INR»)	Plus grande en début de traitement, variable par la suite