

# Traitement intraveineux

## Le DMSO après une extravasation (fuite d'un médicament hors des veines)



Vous allez vous appliquer du DMSO sur la zone de peau touchée par l'extravasation. Cette fiche vous explique ce qu'est ce produit ainsi que les signes et symptômes à surveiller.

### Pourquoi dois-je mettre ce produit ?

Ce produit vous est donné parce qu'il y a eu une fuite accidentelle de votre médicament hors d'une veine. C'est ce qu'on appelle une « extravasation ».

Le DMSO (diméthylsulfoxyde) est un produit qui permet de réduire les dommages (rougeur, enflure, douleur) de la zone de peau touchée par l'extravasation.

Le DMSO est un liquide transparent. Il est remis dans un contenant foncé. Un compte-gouttes pour prendre le médicament est inclus au bouchon de la bouteille.

### Comment appliquer le DMSO ?

Le DMSO doit être appliqué sur et autour de la zone de peau touchée (voir ci-dessous). Assurez-vous que la zone est bien sèche avant de le faire. Appliquez le DMSO **4 fois** par jour (avant les 3 repas et au coucher), pendant **14 jours**.

- 1 Avec le compte-gouttes prenez une petite quantité de DMSO.



- 2 Appliquez quelques gouttes de DMSO sur la région atteinte.



- 3 Utilisez un coton-tige pour étendre le DMSO sur environ le double de la surface de la zone touchée. Exemple : si la zone touchée fait 2 cm sur 1 cm, il faut mettre du DMSO sur 4 cm sur 2 cm. Laissez sécher à l'air libre (ne pas couvrir d'un pansement).



## Où dois-je ranger le DMSO?

- > Il est important de garder ce produit hors de la portée des enfants et des animaux. Par exemple, dans le haut des placards de la cuisine ou de la salle de bain.
- > Ce médicament doit être conservé à la température de la pièce.



## Y a-t-il des effets secondaires possibles?

Voici les légers effets que peut produire le DMSO sur la zone traitée.

- Irritation
- Sécheresse
- Démangeaison ou picotement
- Peau qui pèle
- Rougeur
- Sensation de chaleur

Voici d'autres effets secondaires possibles, mais plus rares.

- Maux de tête
- Mal au cœur (nausées)
- Envie de s'endormir (sommolence)
- Étourdissements

## Quels signes dois-je surveiller?

Les signes d'extravasation et l'inconfort devraient disparaître peu à peu. Toutefois, suivez bien les conseils suivants.

### Contactez une infirmière de votre équipe de soins si vous avez un des signes suivants.

- Modification de la peau de la zone touchée : elle devient plus foncée et change de couleur (rouge, mauve, brune ou noire).

- Augmentation ou apparition de : douleur, rougeur, démangeaisons, ampoules, fentes ou fissures, écoulement, enflure.
- Difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras qui a subi l'extravasation.



## À qui m'adresser pour obtenir de l'aide ou poser des questions?

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre infirmière. Vous pouvez rejoindre celle-ci au numéro suivant :

Tél. : .....

L'infirmière est disponible par téléphone du lundi au vendredi de 8 h à 15 h.



### RESSOURCES UTILES

Il existe d'autres fiches santé produites par le CHUM. Demandez lesquelles pourraient vous convenir.



Vous pouvez aussi les consulter directement sur notre site [chumontreal.qc.ca/fiches-sante](http://chumontreal.qc.ca/fiches-sante)

Inspiré de : Gouvernement du Québec, 2014.

*Le contenu de ce document ne remplace d'aucune façon les recommandations faites, les diagnostics posés ou les traitements suggérés par votre professionnel de la santé.*

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l'Université de Montréal [chumontreal.qc.ca](http://chumontreal.qc.ca)